

# MENINGITIS MED MENINGOKOKKER

## DRÅBESMITTE

### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.



RØD  
ISOLATION

# INFLUENZA

## LUFTBÅREN SMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE.

### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.



RØD  
ISOLATION

# CLOSTRIDIUM DIFFICILE

## DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE. FÆKAL-ORAL SMITTE.

### HÅNDHYGIEJNE

Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres altid når værnemidler aftages.  
Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres af alle, når isolationsenheden forlades.



GUL  
ISOLATION

# MRSA (METHICILLINRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS)

## DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE. DRÅBESMITTE VED LUFTVEJSINFEKTION.

### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.



GUL  
ISOLATION



RØD  
ISOLATION

# VIRAL GASTROENTERITIS

## FÆKAL-ORAL KONTAKTSMITTE. DRÅBESMITTE VED OPKAST.

### HÅNDHYGIEJNE

Patienter tilbydes hjælp til håndvask før måltider og efter toiletbesøg og opkastninger. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres altid når værnemidler aftages. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: ActiChlor Plus 1000 ppm, eller klorklude 1000 ppm.



GUL  
ISOLATION

(Ved eksplosiv opkast)



RØD  
ISOLATION

# VÆRNEMIDLER



GUL  
ISOLATION

=

HANDSKER  
FORKLÆDE



RØD  
ISOLATION

=

HANDSKER  
FORKLÆDE  
MASKE

## VRE (VANCOMYCIN RESISTENTE ENTEROKOKKER)

### DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

**GUL  
ISOLATION**

## RSV (RESPIRATORISK SYNCIAL VIRUS)

### DRÅBESMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

**GUL  
ISOLATION**

## SKORPEFNAT (NORSK FNAT)

### DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Vask hænder og underarme efterfølges af hånddesinfektion.  
Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

**GUL  
ISOLATION**

## ESBL

### DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE. SJÆLDNERE DRÅBESMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

**GUL  
ISOLATION**

(Ved luftvejsinfektion)

**RØD  
ISOLATION**

## LUNGETUBERKULOSE

### DRÅBESMITTE. LUFTBÅREN SMITTE.SMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

**RØD  
ISOLATION**

## CORONAVIRUS (MERS-COV) SÆRLIG SMITSOM LUFTVEJSINFEKTION

### LUFTBÅREN SMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

#### HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.  
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.  
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

#### RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: ActiChlor Plus 1000 ppm, eller klorklude 1000 ppm.

**RØD  
ISOLATION**